

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège  
(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et les GVA)

N° 1 C du 22/02/89 - GRANDES CULTURES N° 1

\*\*\*\*\*  
\* SPECIAL COLZA \*  
\*\*\*\*\*

## CHARANCON DE LA TIGE C.NAPI

Sur l'ensemble de notre réseau d'observation, sauf le Limouxin où leur activité semble moindre, les charançons de la tige C.Napi sont capturés à plus de 10 par jour (seuil d'intervention) en cuvettes jaunes.

Il convient de procéder au **traitement des colzas** qui sont aux stades sensibles le plus rapidement possible à l'aide d'une des solutions suivantes (1):

DECIS	..... 0,3 l/ha
KARATE	..... 0,15 l/ha
METHYL BLADAN	..... 0,9 l/ha

Ces spécialités sont citées à titre d'exemple et disponibles auprès de vos coopératives (1)

C.Napi



1989. v° 1 - 10

4° p 45051

(1) Consultez la notice jointe

Tirage du 22 Février 1989 - 1700 exemplaires

(c) Bulletin technique des Avertissements Agricoles - Montpellier 1989 - SPV

MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX


ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal  
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42

724



# RAVAGEURS DU COLZA

## Cherchez-les au bon moment...



Dessins de A. GRAVAUD (Service de la Protection des Végétaux)


## ... avec la bonne méthode...

### Le piégeage ou technique de la cuvette jaune

- **Mise en place des cuvettes** : dès le semis, ou au plus tard à la levée, dès les premiers réchauffements, les installer à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza; les remplir avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle.

Jusqu'au stade B2, la cuvette est enterrée, puis elle est placée à 25 cm de hauteur.

**Attention !** Le fond de la cuvette doit suivre le niveau supérieur de la végétation.



- **Surveillance** : 2 fois par semaine et tous les jours après les premières captures.
- **Insectes capturés** : grosse altise, charançon du bourgeon terminal, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

### L'observation des plantes

- **Observez 50 plantes** au hasard sur l'ensemble de la parcelle.
- **Insectes** : grosse altise (larve et adulte), puceron cendré du chou, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

### ... et comptez-les



# Quand faut-il traiter ?

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage "cuvette jaune"
Limace	dès les premiers dégâts, du semis au stade B2	
Grosse altise adulte	3 pieds/10 avec morsures nutritionnelles, jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2
Grosse altise larve	2 plantes/3 attaquées	
Puceron cendré	— automne 1 plante/5 colonisée — de C1 à 3-4 semaines avant la récolte : 2 colonies/m <sup>2</sup>	
Charançon du bourgeon terminal		notez les premières captures : intervenez 10 à 15 jours après si le colza est au stade B3
Gros charançon de la tige		après les premières captures, intervenez en tout début d'intensification du vol (stades C1 à T20)
Meligèthe	— stades boutons accolés à D1 : 1 insecte par inflorescence — stades boutons séparés à E : 2 ou 3 insectes	vous indique les premières arrivées vous pouvez alors aller observer
Charançon des siliques	à partir des stades G2 G3 : 1 charançon pour 2 pl	

## Les produits de traitement

### • Contre les limaces

- appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granules par m<sup>2</sup>)
- matières actives : mercaptodiméthur (3 à 5 kg/ha selon les spécialités commerciales)  
métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)

### • Contre les insectes

Au semis		De la levée à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)		A partir de la reprise de végétation			
Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Meligèthe	Charançon des siliques	Puceron
9 kg				Benfuracarbe	Oncol 5 G				
9 kg	9 kg			Carbofuran	Nombreuses spécialités (2)				
12 kg	12 kg			Furathiocarbe	Deltanet				
10 kg				Terbuphos	Counter plus				
9 kg				Thiofanox	Dacamox 5 G - Dacamox 5 S				
18 kg				Phorate + Terbuphos	Dispell				
		0,15 l		Alphaméthrine	Fastac	0,15 l	0,2 l	0,2 l	
		0,07 l		Biphenthrine	Talstar	0,07 l	0,1 l	0,1 l	
				Bromophos	Nexion 25 - Sovinexion 25 Nexion 40 - Nexion EC 40		2 l 1,4 l	2 l	2 l
		0,3 l	0,3 l	Cyfluthrine	Baythroid	0,3 l	0,2 l	0,2 l	
		0,25 l 25 g ma/ha		Cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	0,25 l	0,25 l 20 g ma/ha	0,25 l	
		0,2 l		Deltaméthrine	Décis CE - Décis RU Décis Flo	0,3 l 0,3 l	0,2 l 0,2 l	0,2 l	
				Dialiphos	Torak		1,25 l	1,25 l	
		250 g ma/ha		Endosulfan	Nombreuses spécialités (2)	400 g ma/ha	250 g ma/ha	600 g ma/ha	
		0,6 l		Esfenvalérate	Sumi alfa		0,5 l		
		0,5 l		Fenvalérate	Sumicidin 10		0,4	0,4 l	
		0,2 l		Fluvalinate	Mavrik		0,2 l		0,2 l
		0,15 l		Lambda-Cyhalothrine	Karate	0,15 l	0,1 l	0,1 l	
		200 g ma/ha		Lindane Lindane huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		1,5 l ou 1,5 kg		Malathion	Nombreuses spécialités (2)		1,5 l ou 1,5 kg		
		1,25 kg		Méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	1,5 kg 1,5 l	1,25 kg 1,25 l		
		200 g ma/ha		Parathion Ethyl et Méthyl	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
				Phosalone	Zolone Flo - Azofène Flo Nombreuses spécialités (2)		2 l 1000 g ma/ha	2,5 l 1200 g ma/ha	1,2 l
				Pyrimicarbe	Primor G - Aphox				0,5 kg
		0,75 l		Endosulfan + Parathion Ethyl	Drifène AP - Ekadrine PE	1,25 l	0,75 l		
				Endosulfan + Thiométon	Serk				1,5 l
		1 l 3 l		Lindane + Parathion Ethyl	Sopragam Typholine gamma 50	1,5 l 5 l	1 l 3 l		
		1,75 l		Lindane + Parathion Méthyl	Paralindex	2,5 l	1,75 l		
		0,75 l 0,75 l		Phosalone + Parathion Méthyl	Fortène Taxylone	1,5 l	0,75 l 0,75 l		

1) Doses en l ou kg de produit commercial par ha.

2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.